

Wie entsteht Tibia vara blount?





Kind: 2 Jahre, 7 Monate

Röntgenbild: 03/2018

- Echter Tibia vara blount
- Bilder aus dem Rheinland
- Therapievorschlag: Operation-welche?
- Eltern haben Operation abgelehnt



Kind: 2 Jahre, 7 Monate

Röntgenbild: 03/2018

- Echter Tibia vara blount
- Bilder aus dem Rheinland
- Therapievorschlag: Operation-welche?
- Eltern haben Operation abgelehnt




Kind: 2 Jahre, 9 Monate

Röntgenbild: 05/2018

- Echter Tibia vara blount
- Bilder aus dem Rheinland
- Therapievorschlag: Operation
- Eltern haben Operation abgelehnt
- Uniklinik aus dem Rheinland
- **VERSCHLECHTERUNG**
- Therapievorschlag: wieder Operation
- Eltern haben Operation wieder abgelehnt






Kind: 3 Jahre, 1 Monate

Röntgenbild: 08/2018

Orthesen-Versorgung: 08/2018

- Echter Tibia vara blount
- Bilder Uni Essen
- Weitere VERSCHLECHTERUNG
- Jetzt Orthesentherapie




Kind: 3 Jahre, 5 Monate

Röntgenbild: 12/2018

Orthesen-Versorgung: 08/2018

- Echter Tibia vara blount
- Orthesen-Versorgung verhindert Verschlechterung
- Rechtsseitig sogar Verbesserung






Kind: 3 Jahre, 9 Monate

Röntgenbild: 04/2019

Orthesen-Versorgung: 08/2018

- Echter Tibia vara blount
- Orthesen-Versorgung verhindert Verschlechterung
- Rechtsseitig sogar Verbesserung
- Links keine Veränderung
- Operationen können noch hinaus geschoben werden






Kind A: 1 Jahr, 3 Monate

Röntgenbild: 9/2015

Orthesen-Versorgung: 4/2016

- Verdacht auf Blount-Erkrankung
- Kind noch recht jung, es wurde abgewartet
- Versorgung erst mit 18 Monaten






Kind A: 2 Jahre, 0 Monate

Röntgenbild: 6/2016

Orthesen-Versorgung: 4/2016

- Unter Orthesentherapie ist Verbesserung zu sehen





Kind A: 2 Jahre, 6 Monate

Röntgenbild: 12/2016

Orthesen-Versorgung: 4/2016

- Gesund therapiert
- Klassischer Standardfall
- Ca.150 erfolgreiche Versorgungen
- Hier besonders: Ältere Schwester hat Blount , ist mehrfach operiert worden
- Herkunft Nordafrika, dort Blount häufiger
- Vater hat auch Knie deformität
- Ohne Versorgung hätte Kind Blount bekommen

Wir haben ca. 150 erfolgreiche Versorgungen durchgeführt.

Kind: 2 Jahre, 7 Monate



- 1 Jahr 9 Monate



Kind: 8 Jahre

- UNBEHANDELTEN BLOUNT!

